



**Влияние структурированной воды, получаемой
с применением устройств серии «Vital Water»,
производимых ГК «Комос», на величину надоя
молока и частоту заболевания маститом**

**Ген. Директор ГК «Комос»,
К.т.н., доцент
Лаховский М.Я.**


**Главный зоотехник,
ЗАО «Агрофирма
«Патруши»
Сиромаха С.Н.**




Установка устройства серии «Vital Water» на ЗАО «Агрофирма «Патруши»



Увеличение надоя молока




Изменение надоя в контрольных группах




Изменение надоя в Группе 3 = -5,95% и в Группе 10 = 1,68%

Группа 3 - простая вода весь период, Группа 10 - структурированная вода с 15.05 по 21.06

Снижение заболеваемости маститом



Анализ влияния структурированной воды на снижение заболеваемости маститом



ЗАО «Агрофирма «Патруши»

Результаты

исследования влияния структурированной воды, прошедшей через устройства серии «Vital Water», производимые ГК «Комос», на величину надоя молока и частоту заболевания маститом.

При проведении анализа по оценке влияния структурированной воды, на величину надоя молока и частоту заболевания маститом исследовались две группы коров общим количеством 860 голов:

1. В группу N 1 , пьющей простую воду входили коровы из подгрупп NN 2, 3, 12
2. В группу N 2 , пьющей структурированную воду входили коровы из подгрупп NN 8,9,10,11.

Анализ охватывал два временных периода:

1. Период N1 – с 15 апреля 2009 года по 14 мая 2009 года .
В этот период все исследуемые группы коров пили простую воду.
2. Период N2 – с 15 мая 2009 года по 21 июня 2009 года .
В этот период коровы, входящие в группу N1 по-прежнему пили простую воду, а коровы из группы N2 пили структурированную воду.

Материалы анализа представлены в Приложении к данному документу.

Проведенный анализ дал следующие результаты:

А) По среднесуточному надоем молока .

В группе коров, пьющих структурированную воду превышение среднесуточного надоя по сравнению с группой коров , пьющих простую воду составило 6,62%

Б) По заболеваемости маститом.

В группе коров, пьющих простую воду процент заболеваемости маститом за рассматриваемый период в среднем составил 7,43%, а в группе коров , пьющих структурированную воду процент заболеваемости маститом за рассматриваемый период в среднем составил 2,02%.

Следовательно получено снижение заболеваемости маститом в 3.68 раза.

Директор
ЗАО «Агрофирма «Патруши»

Коротков А.В.

Главный зоотехник,
ЗАО «Агрофирма «Патруши»
Главный ветеринарный врач,
ЗАО «Агрофирма «Патруши»

Сиромаха С.Н..

Степанов И.В.

